「入門 パターン認識と機械学習」　正誤表

頁	箇所	誤	正
12	式（1.27）	$g(\boldsymbol{x}) = \omega_0 + \sum_{i=1}^{d} \omega_i x_i$	$g(\boldsymbol{x}) = \omega_0 + \sum_{j=1}^{d} \omega_j x_j$
42	9行目	**例4.1**　各変数x_{i}が確立θ_{i}で1を，確率1－θ_{i}で0をとるモデル～	**例4.1**　クラスc_jにおいて各変数x_iが確立θ_{ji}で1を，確率1－θ_{ji}で0をとるモデル～
54	下から３行目	$\tilde{\boldsymbol{x}}_1$，$\tilde{\boldsymbol{x}}_2$，…，$\tilde{\boldsymbol{x}}_n$を，平均が$\boldsymbol{0}$，各成分の分散がすべて1となるように基準化したベクトル～	$\tilde{\boldsymbol{z}}_1$，$\tilde{\boldsymbol{z}}_2$，…，$\tilde{\boldsymbol{z}}_n$を，平均が$\boldsymbol{0}$，各成分の分散がすべて1となるように$\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，…，$\boldsymbol{x}_n$を基準化したベクトル～
54	式（5.32）	$\boldsymbol{u}_j^T \tilde{\boldsymbol{x}}_p$	$\boldsymbol{u}_j^T \tilde{\boldsymbol{z}}_p$